Folleto de información al Paciente 051428/5011/CL

Arthrozeel®

Comprimidos Sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Reg. I.S.P. N° H-1085

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Cartilago suis D4 0,3 mg; Funiculus umbilicalis suis D4 0,3 mg; Embryo suis D4 0,3 mg; Placenta suis D4 0,3 mg; Rhus toxicodendron D2 0,54 mg; Arnica montana D1 0,6 mg; Solanum dulcamara D2 0,15 mg; Symphytum officinale D8 0,15 mg; Sanguinaria canadensis D3 0,45 mg; Sulphur D6 0,54 mg; Nadidum D6 0,03 mg; Coenzymum A D6 0,03 mg; Acidum alpha-liponicum D6 0,03 mg; Natrium diethyloxalaceticum D6 0,03 mg; Acidum silicicum D6 3 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

Indicación: Medicamento homeopático útil en el tratamiento de los síntomas de artrosis de diversa etiología.

Advertencias y Precauciones: Úsese sólo por indicación médica. No use dosis mayores ni por más tiempo de lo recomendado. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, en cuyo caso deberá suspender la administración y consultar al médico. Si los síntomas persisten luego de 15 días de tratamiento, consulte al médico. Este medicamento contiene lactosa.

-Heel

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las anacardiáceas (Rhus toxicodendron).

Modo de empleo: En general, dejar disolver lentamente bajo la lengua el comprimido, según indicación médica.

Vía de administración: Oral sublingual.

Interacciones con otros medicamentos: No se han descrito en la bibliografía. Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral, a no ser que su médico se lo indique.

Efectos secundarios: En casos aislados pueden presentarse reacciones de alergia o hipersensibilidad. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníqueselo a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Condiciones de almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C.
Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso.
No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.
No recomiende este tratamiento a otra persona.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; Translation of the 5th Supplement (1991) to the 1978 edition; Official Edition; Deutscher Apotheker-Verlag Stuttgart. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica, Una farmacología selectiva; Vol. 1; 2ª Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991. Vannier L. Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Boiron, France, 1993.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

Fabricado por y bajo licencia de:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:
Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos Nº 260, piso 6
Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl