



Folleto de información al Paciente

052639/5007/CL



Angin-Heel[®]

SD

comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P.N°: H-728

Medicamento homeopático

Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Hydrargyrum cyanatum D8 30 mg; Phytolacca americana D4 30 mg; Apis mellifica D4 30 mg; Arnica montana D4 30 mg; Hepar sulfuris calcareum D6 60 mg; Atropa belladonna D4 60 mg. Excipientes: Lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de amigdalitis aguda.

Advertencias: Este medicamento puede aliviar los síntomas de la faringo-amigdalitis estreptocócica, pero podría no prevenir sus complicaciones. No administrar durante el embarazo o la lactancia, salvo indicación médica. No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico. No administrar por más de 7 días, salvo indicación médica. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia al medicamento, a alguno de sus componentes o a las picaduras de abejas.



-Heel





Modo de empleo: Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas: 6 -11 años: 1 comprimido 2 veces al día, 2 - 5 años: 1 comprimido 1 a 2 veces al día, < 2 años: 1 comprimido al día.

Dosis aguda o inicial: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Dosis Pediátrica Aguda: 6 - 11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar. 2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar. < 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Vía de administración: Sublingual.

Interacciones con otros medicamentos: El efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Si Ud. está tomando otro medicamento en forma crónica, consulte con su médico o con el farmacéutico antes de tomar este producto.

Efectos secundarios: Podría aparecer una leve irritación a la mucosa bucal. Eventualmente podría producirse sialorrea (salivación excesiva), si esto ocurre se debe suspender el tratamiento.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Condiciones de Almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Vol. 1; 2ª Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos N° 260, piso 6
Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

