



Hepeel[®] N

comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o al químico-farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-1088

Medicamento Homeopático

Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Chelidonium majus D6 30 mg; Cinchona pubescens D3 30 mg; Citrullus colocynthis D6 90 mg; Lycopodium clavatum D3 30 mg; Myristica fragrans D4 30 mg; Phosphorus D6 15 mg; Silybum marianum D2 15 mg; Veratrum album D6 60 mg. Estearato de magnesio 1,50 mg; Lactosa c.s. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Disponible en envase de 50 comprimidos.

Venta directa

Indicaciones: Medicamento homeopático útil como coadyuvante en el tratamiento de disfunciones hepáticas y biliares.

Advertencias: Si aparece reacción alérgica suspenda el tratamiento y consulte al médico. El uso de este producto no es a permanencia.

En niños de 6 a 12 años, o durante el embarazo o la lactancia, este medicamento se debe administrar sólo bajo supervisión médica.

No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si los síntomas se mantienen o empeoran luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico.

Contraindicaciones: No se han descrito en la bibliografía.



-Heel





Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. En especial no se recomienda el uso de productos homeopáticos con medicamentos de otra naturaleza. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía.

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Precauciones: Este medicamento contiene Lactosa. Precaución en pacientes diabéticos.

Modo de empleo: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día hasta que desaparezcan los síntomas.

Administración: Vía oral sublingual.

Condiciones de Almacenamiento: Cerrar el tubo de los comprimidos inmediatamente después de su uso. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños!

Mantener el frasco bien cerrado, en su envase original, a no más de 30 °C.

No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

® = Marca Registrada

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

