



# Adrisin<sup>®</sup>

## comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-1229

**Composición:** Cada comprimido sublingual contiene: Acidum arsenicosum D8, Acidum formicicum D8, Acidum sulfuricum D22, Arctium lappa D8, Arnica montana D6, Graphites D10, Histaminum dihydrochloricum D8, Histaminum dihydrochloricum D12, Histaminum dihydrochloricum D22, Ledum palustre D8, Lycopodium clavatum D6, Pix pinaceae D10, Selenium D12, Stibium sulphuratum nigrum D10, Strychnos ignatii D6, Sulfur D12, Tellurium metallicum D10, Thuja occidentalis D6 15 mg cada uno. Excipientes: Lactosa monohidrato, Estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Presentación:** Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

**Indicación:** Medicamento homeopático útil como coadyuvante en cuadros alérgicos, principalmente cutáneos y también respiratorios, desde los 6 años de edad.

**Usos:** Para el alivio temporal de los síntomas de la alergia: estornudos, secreción nasal, ojos llorosos, irritaciones de la piel. Puede ser utilizada también como soporte preventivo (profiláctico) en el manejo de estas condiciones.

**Vía de Administración:** Sublingual.

**Advertencias:** No use dosis mayores a las recomendadas. Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. Si los síntomas persisten o empeoran, luego de 3 días de tratamiento, consulte al médico.

**Precauciones:** Este producto contiene lactosa. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.



**-Heel**





**Uso durante el embarazo y la lactancia:** No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

**Contraindicaciones:** Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

### **Modo de empleo:**

#### **Dosis estándar**

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido, 3 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido dos veces al día.

#### **Dosis aguda o inicial**

Adultos y mayores de 12 años: Dejar disolver lentamente bajo la lengua 1 comprimido hasta 12 veces al día.

Niños de 6 a 11 años: 1 comprimido hasta 8 veces al día.

**Interacciones con otros medicamentos:** Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

**Efectos secundarios:** Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen.

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Condiciones de Almacenamiento:** Almacenar a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

Medicamento Homeopático

### **Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

### **Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

