



Tartephedreel®

Solución para gotas orales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Medicamento Homeopático
Hecho en Alemania
Vía de administración: Oral
Reg. I.S.P. N° H- 1095

Composición: Cada 100 g de solución oral para gotas contiene: Kalium stibyltartaricum D4 10 g; Atropa belladonna D4 10 g; Natrium sulphuricum D4 10 g; Arsenum iodatum D6 10 g; Blatta orientalis D6 5 g; Lobelia inflata D4 5 g; Cephaelis ipecacuanha D4 5 g; Naphthalinum D6 5 g; Illicium verum D3 5 g. Excipientes: Etanol y agua purificada. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Frasco cuentagotas con 30 mL de solución para gotas orales.

Indicaciones: Medicamento útil como coadyuvante en el tratamiento de bronquitis asmática, faringitis, traqueitis, catarro bronquial.

Advertencias: No use dosis mayores a las recomendadas. En niños menores de 12 años úsese bajo supervisión médica. En pacientes con enfermedades tiroideas, no utilizar sin consultar al médico. De producirse una agravación inicial de los síntomas, al administrar este medicamento, debe suspenderlo y consultar al médico.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas 3 veces al día.

Dosis pediátricas:

Menor de 2 años: 3 gotas 3 veces al día.

2-5 años: 5 gotas 3 veces al día.

6-11 años: 7 gotas 3 veces al día.



-Heel



Dosis aguda o inicial:

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 gotas cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Pediatría:

Menor de 2 años: 3 gotas cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2-5 años: 5 gotas cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6-11 años: 7 gotas cada $\frac{1}{2}$ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Interacciones con otros medicamentos: El efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Instrucciones especiales: Para extraer la solución y contar adecuadamente las gotas, coloque el frasco verticalmente.

Efectos secundarios: No se han descrito en bibliografía. En caso de que Ud. Experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Condiciones de almacenamiento: Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener el frasco bien cerrado, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de las gotas inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Venta directa.

® = Marca registrada

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg - Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos 260, Piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

