

Arthrozeel[®] Comprimidos Sublinguales



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N° H-1085

Medicamento homeopático

Medicamento Hecho en Alemania

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Cartilago suis D4 0,3 mg; Funiculus umbilicalis suis D4 0,3 mg; Embryo suis D4 0,3 mg; Placenta suis D4 0,3 mg; Rhus toxicodendron D2 0,54 mg; Arnica montana D1 0,6 mg; Solanum dulcamara D2 0,15 mg; Symphytum officinale D8 0,15 mg; Sanguinaria canadensis D3 0,45 mg; Sulphur D6 0,54 mg; Nadidum D6 0,03 mg; Coenzymum A D6 0,03 mg; Acidum alpha-liponicum D6 0,03 mg; Natrium diethyloxalaceticum D6 0,03 mg; Acidum silicicum D6 3 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

Vías de administración: Oral sublingual.

Indicación: Medicamento útil en el tratamiento de los síntomas de artrosis de diversa etiología.

Modo de empleo: Disolver 1 comprimido sublingual, 3 veces al día.

Advertencias y precauciones: No use dosis mayores a las recomendadas. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico. Este medicamento contiene lactosa. Si usted tiene intolerancia a la lactosa, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Embarazo y lactancia: No existen antecedentes de que las diluciones homeopáticas de los compuestos presentes en este medicamento sean tóxicas durante el embarazo y la lactancia. Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, consulte a su médico o profesional de la salud antes de usar este medicamento durante el embarazo y la lactancia.

Folleto de Información al Paciente

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

Efectos secundarios: Como todos los medicamentos, los medicamentos homeopáticos pueden causar reacciones adversas. En casos aislados se ha informado de alergias cutáneas transitorias.

Interacciones: No se han notificado interacciones y no se prevé que se produzcan debido a las diluciones homeopáticas. Su médico debe estar informado sobre todos los medicamentos tomados recientemente, incluso si son medicamentos sin receta.

Modo de empleo:

Dosis estándar: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis aguda o inicial: 1 comprimido cada ½ o 1 hora, hasta un máximo de 12 comprimidos al día y continuar con dosis estándar.

Disolver lentamente bajo la lengua y luego tragar. En dificultad para disolver en boca, triturar el comprimido puede triturarse y disolver en una pequeña cantidad de agua. Tomar alejado de las comidas.

Propiedades

Arthrozeel comprimidos sublinguales ayuda a aliviar los síntomas de la artrosis; como dolor, rigidez. Arthrozeel es seguro si se usa siguiendo las instrucciones de uso.

Condiciones de almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Mayor información en: www.ispch.cl

Fabricado por y bajo licencia: Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg – Str 2-4.76532 Baden – Baden. Alemania

Importado y distribuido por: Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda. Encomenderos 260, Piso 6. Las Condes, Santiago - Chile