

# Ubichinon compositum

## Solución inyectable

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-1148

Medicamento Homeopático

**Composición:** Cada ampolla de 2,2 mL contiene: Acidum ascorbicum D6 22,0 mg; Thiaminum hydrochloricum D6 22,0 mg; Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22,0 mg; Pyridoxinum hydrochloricum D6 22,0 mg; Nicotinamidum D6 22,0 mg; Vaccinium myrtillus D4 22,0 mg; Colchicum autumnale D4 22,0 mg; Podophyllum peltatum D4 22,0 mg; Conium maculatum D4 22,0 mg; Hydrastis canadensis D4 22,0 mg; Galium aparine D6 22,0 mg; Acidum L-(+)-lacticum D6 22,0 mg; Hydrochinonum D8 22,0 mg; Trichinoylum D10 22,0 mg; Sulfur D8 22,0 mg; Antrachinonum D10 22,0 mg; Naphotochinonum D10 22,0 mg; Para-Benzochinonum D10 22,0 mg; Ubichinonum D10 22,0 mg; Adenosinum triphosphoricum D10 22,0 mg; Coenzym A D10 22,0 mg; Acidum acetylosalicylicum D10 22,0 mg; Histaminum D10 22,0 mg; Nadidum D10 22,0 mg; Magnesium gluconicum D10 22,0 mg; Acidum alpha-liponicum D8 22,0 mg; Manganum phosphoricum D8 22,0 mg; Natrium diethyloxalaceticum D8 22,0 mg. Excipientes: cloruro de sodio, agua para inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Presentación:** Estuche con 5 ampollas con 2,2 mL de solución inyectable cada una.

Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.

**Indicación:** Medicamento homeopático, propio de la terapia antihomotóxica, útil en la reactivación de sistemas enzimáticos bloqueados o alterados.

**Advertencias:** Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores a las recomendadas, ni use el medicamento por más tiempo del recomendado.



**Contraindicaciones:** Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes.

No usar en embarazo, lactancia, ni en niños menores de 12 años.

**Efectos secundarios:** No se han descrito.

En caso de que usted experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Interacciones con otros medicamentos:** Si bien no se han descrito el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

**Modo de empleo:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante, la dosis usual recomendada es: 1 ampolla 1 a 3 veces por semana.

**Vía de administración:** intravenoso (i.v.), intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.).  
Administrar lentamente al utilizar la vía intravenosa (i.v.).

**Condiciones de almacenamiento:** Almacenar a no más de 30 °C. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Mantener fuera del alcance de los niños.

**No repita el tratamiento sin indicación médica.**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

### **Bibliografía:**

German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition 1978.

Vannier L., Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homéopathique; Editions Boiron, France, 1985. Reckeweg, H.H.; Materia Médica; Homeopatía Antihomotóxica. Una farmacología selectiva; Vol.1; 2a Ed.; Aurelia-Verlag; Baden-Baden; 1991.

### **Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos N° 260, piso 6, Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)