



Folleto de Información al Paciente

052309/5011/CL



Gripp-Heel[®]

Comprimidos Sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Medicamento Homeopático

Hecho en Alemania

Reg. I.S.P. N° H-727

Composición: Cada comprimido sublingual contiene: Aconitum napellus D4 120 mg; Bryonia cretica D4 60 mg; Lachesis mutus D12 60 mg; Eupatorium perfoliatum D3 30 mg; Phosphorus D5 30 mg. Excipientes: lactosa y estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Presentación: Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa

Indicación: Coadyuvante en el tratamiento de estados gripales.

Advertencias: Puede producirse un agravamiento inicial de los síntomas al inicio del tratamiento, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia.

No use dosis mayores ni por más tiempo de lo recomendado. Si los síntomas persisten o empeoran luego de tres días de tratamiento, consulte al médico.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia al medicamento o a alguno de sus componentes.

No administrar durante el embarazo y la lactancia.

Efectos secundarios: No se han descrito en la bibliografía. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

Vía de Administración: Sublingual



-Heel





Interacciones con otros medicamentos: Los efectos de un medicamento pueden alterarse al usarlos con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Precaución: Este medicamento contiene lactosa.

Modo de empleo:

Las dosis recomendadas son:

Dosis estándar

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.

Dosis pediátricas

Menor de 2 años: 1 comprimido una vez al día

2 - 5 años: 1 comprimido una vez al día

6 - 11 años: 1 comprimido 2 veces al día

Dosis aguda o inicial:

Adultos y niños mayores de 12 años:

1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 12 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Dosis Pediátrica Aguda:

Menor de 2 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 4 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

2 - 5 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 6 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

6 -11 años, 1 comprimido cada ½ a 1 hora, hasta 8 veces al día, y luego continúe con dosis estándar.

Condiciones de almacenamiento: Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Mantener lejos del alcance de los niños.

® = Marca registrada

Fabricado por y bajo licencia:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.

Encomenderos 260, Piso 6

Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

