



Folleto de información al Paciente

052312/5007/CL



# Spigelon®

## comprimidos sublinguales

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P.N° H-925

Hecho en Alemania

**Composición:** Cada comprimido sublingual contiene: Spigelia anthelmia D3 30 mg; Atropa belladonna D3 30 mg; Bryonia cretica D3 30 mg; Gelsemium sempervirens D3 30 mg; Melilotus officinalis D3 30 mg; Natrium carbonicum D3 30 mg; Acidum silicicum D12 60 mg; Thuja occidentalis D12 60 mg. Como excipientes: estearato de magnesio y lactosa. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

**Presentación:** Envase con 50 comprimidos sublinguales.

Venta directa en establecimientos tipo A y B

**Indicaciones:** Medicamento útil en la prevención y tratamiento de la migraña y cefaleas.

**Advertencias:** Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, generalmente es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores ni por más tiempo del recomendado. Si los síntomas se mantienen o intensifican después de 3 días de tratamiento, consulte al médico. Cerrar el frasco de los comprimidos inmediatamente después de su uso. No administrar a menores de 12 años, ni durante el embarazo o la lactancia, salvo indicación médica.

**Contraindicaciones:** No administrar en caso de antecedentes de alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.



**-Heel**





**Modo de empleo:** En casos agudos se recomienda disolver lentamente 1 comprimido bajo la lengua, cada 15 minutos, durante un período máximo de 2 horas. En la prevención se recomienda administrar 1 comprimido bajo la lengua, 3 veces al día. El tratamiento se podrá realizar hasta por 6 meses consecutivos. Si los síntomas reaparecen, podrá reiniciar el tratamiento luego de 1 mes de descanso.

**Vía de administración:** Sublingual.

**Interacciones con otros medicamentos:** Los efectos de un medicamento pueden alterarse si se administra junto con otros. En especial no se recomienda el uso de productos homeopáticos con medicamentos de otra naturaleza. Ante cualquier duda consulte con el médico o químico farmacéutico.

**Efectos secundarios:** No se han descrito en la bibliografía. En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocado o agravado por el uso de este medicamento, comuníquese a su médico o farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria.

**Precaución:** Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes diabéticos.

**Condiciones de Almacenamiento:** Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**Bibliografía:** German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition, 1978. Vannier; Poirier J.; Précis de Matière Médicale Homeopathique; Ed. Boiron, 1985. Reckeweg H.H.; Materia Médica; Vol. 1, 2° Ed; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

® = Marca Registrada

Medicamento Homeopático

**Fabricado por y bajo licencia de:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
76532 Baden-Baden, Alemania

**Importado y distribuido por:**

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.  
Encomenderos N° 260, piso 6  
Las Condes - Santiago, Chile  
Mayor información en: [www.ispch.cl](http://www.ispch.cl)

