




Folleto de Información al Paciente

070794/5004/CL



Coenzyme compositum

Solución Inyectable

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Reg. I.S.P. N°: H-1140

Medicamento homeopático

Composición: Cada ampolla de 2,2 ml contiene: Coenzym A D8; Acidum ascorbicum D6; Thiaminum hydrochloricum D6; Natrium riboflavinum phosphoricum D6; Pyridoxinum hydrochloricum D6; Nicotinamidum D6; Acidum cis-aconiticum D8; Acidum citricum D8; Acidum fumaricum D8; Acidum alpha-ketoglutaricum D8; Acidum DL-malicum D8; Acidum succinicum D8; Barium oxalsuccinicum D10; Natrium diethylalaceticum D6; Natrium pyruvicum D8; Cysteinum D6; Pulsatilla pratensis D6; Hepar sulfuris D10; Sulfur D10; Adenosinum triphosphoricum D10; Nadidum D8; Manganum phosphoricum D6; Magnesium oroticum D6; Cerium oxalicum D8; Acidum DL-alpha-liponicum D6; Beta vulgaris conditiva D4 cada 22 mg aa. Excipientes: Cloruro de Sodio, agua para inyectables c.s. Elaborado conforme a las normas Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Venta bajo receta simple.

Indicación: Medicamento homeopático propio de la terapia antihomotóxica, útil en la estimulación de sistemas enzimáticos bloqueados o alterados.

Advertencias: Puede producirse una agravación inicial de los síntomas, lo cual es pasajero y no reviste mayor importancia. No use dosis mayores a las recomendadas, ni use el medicamento por más tiempo del recomendado. El uso en embarazo y lactancia debe realizarse con especial orientación médica.

Contraindicaciones: Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes. No usar en niños menores de 12 años.

Efectos secundarios: No se han descrito.



-Heel





Interacciones con otros medicamentos: Si bien no se han descrito, el efecto de un medicamento puede alterarse si se administra junto con otros. Evite administrarlo simultáneamente con otros medicamentos de uso oral. Ante cualquier duda consulte al médico o farmacéutico.

Modo de empleo: El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es una ampolla 1 a 3 veces por semana.

Vía de administración: intravenoso (i.v.), intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.). Administrar lentamente al utilizar la vía intravenosa (i.v.).

Presentación: Estuche con 5 ampollas con 2,2 ml de solución inyectable cada uno.

Condiciones de almacenamiento: Almacenar a no más de 30 °C. Manténgase lejos del alcance de los niños. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

Bibliografía: German Homeopathic Pharmacopoeia; First Edition 1978. Vannier; Poirier J.; Precis de Matière Médicale Homeopathique; Ed. Boiron 1985. Reckeweg H.H.; Materia Medica; Vol. 1°; 2° Ed.; Baden-Baden; Aurelia Verlag; 1991.

Fabricado por y bajo licencia de:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
76532 Baden-Baden, Alemania

Importado y distribuido por:

Productos Farmacéuticos Heel Chile Ltda.
Encomenderos N° 260, piso 6, Las Condes - Santiago, Chile

Mayor información en: www.ispch.cl

